

## Вторичная обструкция мочеточника при тотальном протезировании бедра.

**Bamelis, De Graeve & Baert (Department of Urology, University Hospitals of the KULeuven, Belgium)**

**British Journal of Urology**

**Volume 81 Issue 2 Page 333 - February 1998**

Мужчина в возрасте 68 лет при амбулаторном обращении предъявлял жалобы на тупые боли в правой поясничной области в течении 3-х недель, имело место 2 эпизода почечной колики справа. Медикаментозная терапия при почечной колике эффективна, но оставались неприятные ощущения в правой поясничной области. В анамнезе тяжелая патология бедра с протезированием правого бедра, в 1983г. ревизия и повторное тотальное протезирование. При внутривенной урографии, антеградной пиелографии справа выявлена обструкция в области тазового отдела мочеточника (в проекции крестцово-подвздошного сочленения), на кончиках мигрировавших шурупов из правой вертлужной впадины.



Рис.1. Антеградная пиелография(слева) и внутривенная урография(справа). Отмечается обструкция правого мочеточника в области его тазового отдела. Миграция шурупов из вертлужной впадины

При компьютерной томографии выявлен околочеточниковый фиброз в этой области, возникший вероятнее всего мигрировавшими шурупами. Доступом Gibson произведен уретеролиз, удаление мигрировавших шурупов. Послеоперационное течение протекало без осложнений, болевой синдром купировался. Контрольное обследование через 3 и 6 месяцев зарегистрировало отсутствие субъективных ощущений, нормализацию урограмм.